

MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w WARSZAWIE


Wysoka zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



INSPEKCIJA
WETERYNARYJNA

Grypa ptaków jest chorobą wirusową występującą u drobiu i ptaków dzikich. Grypa ptaków może mieć różny przebieg u drobiu, od zachorowania z łagodnymi objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci choroby, ze śmiertelnością sięgającą 100 proc.

Straty ekonomiczne powodowane przez grypę ptaków zależą od zjadliwości szczepu wirusa grypy, gatunku i liczby ptaków oraz liczby ferm dotkniętych chorobą. **Największe straty powodują epidemię HPAI u drobiu utrzymywaneego w fermach przemysłowych na obszarach intensywnej produkcji.** Są one wynikiem nie tylko wysokiej śmiertelności drobiu, ale w dużym stopniu również kosztów likwidacji i odszkodowań, a także wstrzymania przemieszczania i eksportu.



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Wysoka zjadliwa grypa ptaków (HPA) na Mazowszu




INSPEKCJA
WĘTERYNARZYNNA

Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
przypominają o **bezwględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji,**
poprzez m.in.:

- zabezpieczenie paszy i pojedów przed dostępem zwierząt dzikich;
- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego
- mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami;
- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach - bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

**Główna przyczyna rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8
są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania
wirusa przyczynia się również człowiek!**



Wysoka zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń skierowanych w szczególności do **osób posiadających drób oraz pracujących na fermach drobiu.**

Osoby takie:

powinny m.in.:

- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym
- dotyczyć, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
- poić drobiu wodą ze zbiorników dostępnych dla ptactwa dzikiego,
- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany

nie powinny m.in.: